

Ici comme dans bien des domaines la thérapeutique peut plus qu'elle ne comprend. La cure d'altitude possède une action remarquable contre l'asthme de l'enfant. Comment peut-on dès lors l'intégrer dans le traitement :

— en cure de 1 à 2 mois elle constitue une forme un peu plus sophistiquée de vacances à la montagne. L'enfant rompt avec une série de crises qui alourdissent le traitement médicamenteux, restaure un état général médiocre, accomplit des vaccinations légales, incomplètes ou négligées ;

— **en cures longues** l'altitude permet actuellement à des enfants asthmatiques graves de passer 1 an, 2 ans, 3 ans, toute leur année scolaire dans des établissements qui sont organisés pour faire face aux besoins d'enseignement, mais il s'agit-là, bien sûr, d'une indication thérapeutique qu'on

ne saurait appliquer à la légère car un enfant est fait pour « pousser » câlé entre un père et une mère !

L'asthme est, on le sait, une maladie de la vie toute entière, malgré ses émergences discontinues ; cette maladie est pénible, particulièrement cruelle chez l'enfant. Elle est donc forcément un terrain de « chocs » pour les abus thérapeutiques. C'est ce qui donne tout son prix à la réflexion commune de ces deux journées. La cure climatique est la méthode la plus efficace que nous connaissions pour arrêter chez certains enfants asthmatiques un abus médicamenteux, qui devient parfois l'aspect le plus préoccupant de leur maladie.

Ph. CAUCHOIS et G. ENAUD-BRULEY.

CORRESPONDANCE

PROPOSITION D'ÉTUDE COOPÉRATIVE SUR LE TAUX NORMAL DES IgE CHEZ L'ENFANT

Pour mieux identifier le taux normal des IgE chez l'enfant de moins de 16 ans, le Dr G. de MONTIS propose une **étude coopérative** à tous les laboratoires qui utilisent le test radio-immunosorbant (phadebas IgE test).

Les résultats seront étudiés par l'Unité de Recherches statistiques de Villejuif (Pr SCHWARTZ).

Les laboratoires intéressés sont priés d'adresser au Dr G. de MONTIS, les résultats de leurs séries témoins de dosage d'IgE chez l'enfant en précisant :

- l'âge (en mois),
- le sexe,
- le taux trouvé des IgE (uniquement par la méthode phadebas avec détermination de la radio-activité de la phase **solide**),
- si possible en précisant le stade pubertaire.

Pr Ag. G. de MONTIS,
Hôpital St-Vincent de-Paul,
75674 PARIS CEDEX 14.