

UNE POLLINOSE PRÉCOCISSIME

M. FILOU et P. CHOIGNON (*)

MOTS CLES MEDLARS : Rhume des foins * étiologie - Pollen - Graminées.

INDEX TERMS : Hay fever * etiology - Pollen - Grasses.

M. Cl. LAL..., instituteur de 40 ans était suivi depuis 1966 pour un rhume des foins typique, avec sensibilisation exclusive aux pollens de graminées. Il avait fait l'objet pendant la saison 1966-1967 d'un traitement sur le mode pré-saisonnier. Comme il n'en avait reçu aucune amélioration, nous l'avons traité ensuite par quadrillages, suivant la méthode de Louis GUIBERT, avec un succès complet. Il venait à la consultation deux ou trois fois, en mai et juin, et ses symptômes n'étaient plus qu'un souvenir.

Aussi fûmes-nous fort surpris lorsque le 27 février 1971, il apparut, toussant, se mouchant, les yeux rouges ; les manifestations apparaissaient avec deux grands mois d'avance ! Assez perplexes nous recherchâmes l'apparition d'une sensibilisation aux pollens des Bétulacées, non exceptionnelle dans la région, mais sans succès ; aucun animal n'était apparu au foyer, et un déménagement survenu quelques mois auparavant n'avait pas été accompagné de changement notable des conditions de vie ; M. LAL... demeurait donc allergique aux pollens de graminées, et aux pollens de graminées seulement. La saison n'était pas exceptionnellement précoce, et à notre connaissance, les graminées étaient encore loin de pouvoir polliniser ! Assez honteux, nous reconnûmes notre ignorance et conseillâmes la prise de quelques corticoïdes.

Huit jours après, quand nous revoyons le malade, il nous apporte deux ou trois pieds d'une herbe minuscule, une graminée incontestablement, qui à la loupe montrait de petites anthères parfaitement mûres ! M. LAL... nous explique que derrière sa maison, une cuvette sableuse formant réflecteur naturel était couverte de cette petite plante et que son petit jardin tirait grand profit de ce microclimat exceptionnel.

**

Il ne fut pas très difficile d'identifier alors *Mibora minima* (L) Desv., dans l'ancienne nomenclature, actuellement *Mibora verna* ; la flore de Fournier donnait une période de floraison de mars à mai, assez différente en cela de celle de Bonnier (février-mars).

Il est sans doute assez exceptionnel d'obtenir une concentration pollinique suffisante pour obtenir des manifestations allergiques avec cette seule graminée, mais il faut convenir que les conditions locales entraînent des modifications non négligeables des calendriers polliniques avec lesquels nous travaillons. En ce qui concerne M. LAL..., il est maintenant régulièrement quadrillé vers la fin de l'hiver, et attend ainsi sans ennui la saison « classique des graminées ».

(*) Service ORL, Hôpital St-Antoine, 184, rue du Faubourg St-Antoine, 75571 PARIS CEDEX 12.