

Centre d'Etudes Biologiques de l'Ordre de Malte
Institut de Médecine Sociale, Rome
Laboratoires scientifiques "Lofarma", Milan, Italie

ALLERGENES ET MALADIES ALLERGIQUES EN ITALIE

Par

GIUSEPPE CENTANNI, VITTORIO RIVOSECCHI & LUISA BUSINCO

La Section Allergènes de notre Laboratoire a examinés pendant 5 années (1953-57) 6.250 malades qui présentaient des syndromes allergiques.

Afin de donner des bases statistiques à notre enquête on croit nécessaire quelque observation au sujet des antigènes qu'on a découvert à l'origine des différentes symptomatologies cliniques.

Entre les 6.250 malades, 4.060, c'est à dire le 65 %, ont résulté atteints de pollinosis, tandis que 2.190 (35 %) ont résulté sensibles à des poudres inhalantes et à mycètes, avec syndrome asthmatique.

Les 4.060 atteints de pollinosis ont résulté sensibles aux suivantes familles de pollens dans le pourcent indiqué :

n° 2.639 tel que le 65 % sensibles aux <i>graminaceae</i>	
730	18 % sensibles à la <i>parietaria officinalis</i>
324	8 % sensibles aux <i>asteraceae (sompositae)</i>
284	7 % sensibles à des associations entre les différentes familles de pollens dites ci-dessus
81	2 % sensibles à de différentes familles de pollens (par ex : <i>Chenopodiaceae, leguminosae, platanaceae, hippocastanaceae</i> , etc.)

Quant aux sensibilisations aux *graminaceae* on a trouvé qu'entre 2.639 malades, 527, c'est à dire le 20 % présentaient

des associations avec d'autres allergènes, tels que les inhalants (poudres, fibres textiles etc.) ou les mycètes (*aspergilli*, *penicillia*, etc.).

Entre les 2.190 qui ne sont pas atteints de pollinosis, les premières indications nous donnent les résultats suivants :

- n° 1.598 tel que le 73 % ont résulté sensibles à des associations parmi de différentes allergènes inhalants (fibres textiles, poudres d'habitations, plumes, desquamations épidermiques, poils d'animaux) et parmi ceux-ci et les mycètes
- | | |
|-----|--|
| 547 | 25 % ont résulté sensibles seulement aux poudres des habitations |
| 43 | 2 % ont résulté sensibles aux mycètes appartenants aux familles suivantes: <i>aspergillus</i> , <i>penicillium</i> , <i>mucor</i> , <i>alternaria</i> , et à des autres. |

Luisa Businco,
Via Agrigento 6,
Roma.

This document is a scanned copy of a printed document. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material.