

低アレルゲン米の有用性について—CAST 法を用いての検討

¹⁾日本臨床アレルギー研究所, ²⁾東京大学小児科, ³⁾大島小児科,⁴⁾三菱化学 BCL 研究所, ⁵⁾越後製菓研究所, ⁶⁾東大分院小児科十字文子¹⁾ 狩野博嗣²⁾ 成田雅美²⁾澁谷紀子²⁾ 成高信一³⁾ 北浦次郎²⁾菅原由人⁴⁾ 笹川秋彦⁵⁾ 岩田 力⁶⁾

アトピー性皮膚炎患者において, 常食する米の除去は困難であるが, 高圧処理により, 米アルブミングロブリンを 95% 除去した低アレルゲン米 (A カット米) の有用性を検討した. 対象は AD 患者 7 名 (男 3, 女 4), 年齢 11 カ月~4 歳 8 カ月 (平均 3 歳 2 カ月), 米 RAST スコア 1 又はそれ以上の患者を用いた. 低アレルゲン米を 4 週間摂取, 前後に末梢血より得た buffy coat を米アルブミン, グロブリン 0.1 ~1000 pg/ml の 10 倍希釈濃度を用いて刺激し, sLT 遊離の刺激指数 (SI) を CAST 法により求め, 低下率を測定した.

米アルブミン刺激では, 最高 22.4~96.5% (平均 70.9) の低下が認められた. 米グロブリン刺激では最高 33.3~97.0% (平均 72.9) の低下が認められた. 全例において, 皮膚症状の改善を認めた.

Key words : atopic dermatitis — cellular antigen stimulation test (CAST) — hypoallergenic rice — Stimulation Index (S.I.)

はじめに

日常摂取する食物による異常反応¹⁾ (adverse reaction to food) はよく知られているが, その中で, 免疫学的な機序の明らかなものは, 食物アレルギー (food allergy) と呼ばれている²⁾³⁾. 小児における食品の内, 卵・牛乳・大豆は三大アレルゲンとして, アレルギー疾患における関与, 機序などが解明されており, その除去に関しては比較的容易であるが, 主食である米や小麦に関しては除去が困難で明確な急激な症状を呈する場合を除き, その除去は余りされておらず, 又臨床的な解析も少ない⁴⁾⁵⁾. 今回我々は高圧処理により米アルブミン・グロブリンを 95% 除去した低アレルゲン米 (A)⁶⁾を用いて, その有用性を検討した.

対 象

小児のアトピー性皮膚炎患者 7 例 (男 4, 女 3, 内 3 例は気管支喘息を合併), 年齢 11 カ月~4 歳 8 カ月 (平均 3 歳 2 カ月) を対象とした (Table 1). 末梢血 IgE 値は 130~3300 U/ml (平均 1540), 皮膚テスト及び RAST にて陽性 (スコア ≥ 2) のアレルゲンは HD とダニ 3 例, 卵 6 例, 牛乳 3 例, 大豆 5 例, 小麦 5 例, ソバ粉 4 例, 猫毛 1 例, ホーレンソウ 1 例, ピーナッツ 1 例, 魚 1 例, カンジダ 2 例, アスペルギルス 1 例であった. これらの患者は, 卵・牛乳・大豆・小麦・ホーレンソウ・ソバ粉等の食品は除去又は制限をしており, 又外用, 消毒療法等にて, 主要な症状は軽快しているが, 時に原因が分らず, 全身のかゆみ, 部分的な悪化, 粗雑な皮膚症状がみられている. 7 例中 2 例では酵素処理米を一時期試みたこともあったが, 症状の改善には気付いていない. 米による RAST は, スコア 3, 1 例, スコア 2, 5 例, スコア 1, 1 例である. コントロールには, 健康成人 7 例 (男 3, 女 4, 22~32 歳, 平均 27 歳 8 カ月) を用いた.

Received : May 15, 1998

Accepted : December 2, 1998

Abbreviations : AD atopic dermatitis ; ELISA enzyme-linked immunosorbent assay ; RAST radioallergosorbent test ; SDS-PAGE sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis ; S.I. Stimulation Index ; sLTs sulfide leukotriens

Table 1 Profile of the patient

Patient	Sex	Age	Diagnosis	IgE (U/ml)	RAST (≥ 2)	Rice (RAST)
a	f	11m	AD	1300	egg milk wheat soybean	2
b	m	4y8m	AD	3300	HD mite egg soybean milk wheat Candida cat	2
c	m	4y4m	A AD	3000	egg soybean wheat buckwheat	3
d	f	3y8m	A AD	130	HD mite Aspergillus Candida	2
e	m	3y1m	AD	1100	egg milk soybean wheat buckwheat spinach	2
f	f	1y11m	AD	140	egg buckwheat	1
g	m	3y9m	A AD	1800	HD mite egg soybean wheat buckwheat peanut fish	2

A : asthma

AD : atopic dermatitis




Fig. 1. Cellular antigen stimulation test (CAST).

方 法

アトピー性皮膚炎に対する治療法（主として外用，消毒療法）は従来通りに行い，又，低アレルゲン米（A）も，通常米と同じ量（50 g～400 g）を4週間摂取させ，前後，末梢血より白血球を分離し，CAST（cellular antigen stimulation test）法⁸⁾⁹⁾により米アルブミン，グロブリン刺激及び positive control として，抗 IgE 刺激によるロイコトリエン遊離能を測定した。

CAST の方法は De Weck らの方法により行った（Fig. 1）。すなわち，末梢血をデキストラン法により，採取した buffy coat を IL-3 にて刺激後，米アルブミン 0.1～10³，米グロブリン 0.1～10³pg/ml（10 倍希釈），ま

たは抗 IgE を加え，37°C，40 分 incubate 後，上清中に遊離した sulfide leukotriene C₄,D₄,E₄（sLTs）を ELISA 法にて測定し，得られた値を，抗原を加えないブランクの値で除し，刺激指数（Stimulation Index, S.I.）を求めた。

結 果

米アルブミン 0.1 pg/ml 刺激では，患者群 0.32～4.03（mean ± SEM, 1.66 ± 0.47），1 pg/ml にて 0.47～5.12（2.74 ± 0.74），10 pg/ml にて 1.16～27.90（6.89 ± 3.67），100 pg/ml にて 1.00～50.0（14.4 ± 6.81），1000 pg/ml にては 0.84～14.0（5.32 ± 1.91）の SI が得られた。

一方コントロール群は 0.1 pg/ml にて 0.39～5.98（mean ± SEM, 1.72 ± 0.57），1 pg/ml にて 0.39～2.27（0.99 ± 0.18），10 pg/ml にて 0.39～1.11（0.86 ± 0.09），100 pg/ml にて 0.30～2.40（1.20 ± 0.19），1000 pg/ml にて 0.39～1.48（0.99 ± 0.16）で，患者群とコントロール群をそれぞれの濃度で比較すると，1 pg/ml, 1000 pg/ml にては，患者群において有意の高値を示した（ $p < 0.05$ ）。米グロブリン 0.1 pg/ml 刺激では 0.8～4.99（mean ± SEM, 2.00 ± 0.56），1 pg/ml にて 0.96～3.26（1.82 ± 0.37），10 pg/ml にて 1.08～4.73（2.38 ± 0.49），100 pg/ml にて 1.00～14.2（5.09 ± 1.89），1000 pg/ml にて，0.67～13.30（5.12 ± 1.76）であった。一方コントロール群は 0.1 pg/ml にて，0.3～1.32（mean ± SEM, 0.88 ± 0.13），1 pg/ml にて 0.3～1.61（0.98 ± 0.14），10 pg/ml にて 0.39～2.84（1.31 ± 0.24），100 pg/ml にて 0.37～2.27（1.25 ± 0.22），1000 pg/ml にて 1.08～4.07（2.15 ± 0.44）と患者群にて高値を示し，0.1～100 pg/ml にて有意の高値を示した（ $p < 0.05$ ）（Fig. 2）。抗 IgE 刺激にては，患者群 1.59～64.00（mean ± SEM, 27.90 ±




Fig. 2. CAST by rice albumin and globulin.

By albumin patient group (●) showed higher stimulation index than control (○).

By 1 pg/ml and 1000 pg/ml there were a significant differences ($p < 0.05$). By globulin the patient group showed higher stimulation index and there were significant differences ($p < 0.05$) by globulin 0.1~100 pg/ml.

9.22), コントロール群 0.97~5.98 (3.20 ± 0.9) にて患者群が有意の高値を示した ($p < 0.05$) (Fig. 3).

低アレルゲン米食後の CAST による刺激指数は米アルブミン 0.1 pg/ml にて $0.78 \sim 1.14$ ($\text{mean} \pm \text{SEM}, 0.93 \pm 0.04$), 1 pg/ml にて $0.64 \sim 2.36$ (1.34 ± 0.23), 10 pg/ml にて $0.90 \sim 1.97$ (1.26 ± 0.13), 100 pg/ml にて $0.94 \sim 10.5$ (3.06 ± 1.30), 1000 pg/ml にて $0.34 \sim 6.98$ (1.77 ± 0.86) であった。米グロブリンの CAST 刺激指数は 0.1 pg/ml にて $0.71 \sim 1.33$ ($\text{mean} \pm \text{SEM}, 1.04 \pm 0.08$), 1 pg/ml にて $0.64 \sim 1.26$ (1.00 ± 0.08), 10 pg/ml にて $0.64 \sim 2.06$ (1.29 ± 0.21), 100 pg/ml にて $0.9 \sim 2.44$ (1.24 ± 0.20), 1000 pg/ml にて $0.23 \sim 2.79$ (1.38 ± 0.35) であった。即ち、低アレルゲン米食を 4 週間続けた後の CAST の低下率は米アルブミンにては最高 22.4~96.7%, 米グロブリンにては 1 例を除く 6 例に最高 57.4~96.98% の低下率が認められた (Fig. 4)。

一方、抗 IgE 刺激による CAST 刺激指数は、低アレルギー米食前 $1.59 \sim 64.0$ ($\text{mean} \pm \text{SEM}, 27.9 \pm 9.2$) から

1.10~20.0 (7.66 ± 2.81) と有意の低下がみとめられた ($70.32 \pm 11.02\%$, $p < 0.05$)。皮膚症状は 3 例ではステロイドの外用を要せず、4 例にてステロイド外用量が減少し、全例において、発赤、苔癬化が改善し、しかも皮膚の粗雑さが改善した。以下に代表的な症例を呈示する。

症例 1. 三〇理〇子 女 3 歳 8 カ月 (case D)

乳児期より軽度の湿疹があったが外用療法にて治まっていた。1 歳頃より風邪の時に咳発作、喘鳴が起こる様になり、頻繁に呼吸困難を主訴として、救急処置を受けるようになった。3 歳、当科受診、検査にて IgE 130 U/ml, RAST にてはハウスダスト、ダニ、米、カンジダ、アスペルギルスに陽性であった。初診時、皮膚症状および中等度の発作頻発により食物除去 (卵、牛乳、大豆)、インター水溶液 + Venetlin 定時吸入療法 1 日 3 回を開始 (平成 8 年 6 月) し、小康状態を保っていたが、皮膚症状は原因不明に増悪することが度々起




Fig. 3. CAST by anti-IgE.

Patient group showed significant higher stimulation index than control ($p < 0.05$).

こった。平成8年8月(3歳7カ月), 実家に行き, おもち(150g)を摂取後, 数時間後に頭頸部, 腕肩背中, 腹部, そけい部から腿に発疹, そう痒, 掻破を起こし浸潤傾向を示し, 近医を受診した。米との関連を指摘され, 米を1日3食→1食に減らした。以後, 皮膚症状は頸部, 前腕, 膝窩部に限極してきたが夜中に痒みでかきむしることがあった。平成8年9月より低アレルギー米を開始(1日1回, 200g), 前と4週間後にCASTを施行し, 刺激指数を求めた。米アルブミンのCASTによる刺激指数(S.I.)は最高8.94→0.94と89.5%, 米グロブリンでは7.16→0.94と86.9%の低下が認められた。抗IgEのCASTも, 36.0から3.10と91.4%の低下をしめた。なお, 皮膚の発赤, かゆみは軽度にて, 日常の支障はなく(夜のかゆみも起こらず)又, 喘息症状も小康状態を保っている。

症例2. 丹〇一〇 男3歳9カ月 (case G)

新生児期, 顔面～頭部の湿疹があり, 外用薬を使用し, 一時的な改善をみるが中止すると再発し, 3カ月では全身に広がってきた。近医にて除去食療法(卵, 牛乳, 大豆製品), 外用療法を受けていた。1歳6カ月時に当科を受診した。

現症: 発育やや不良。全身性に湿疹局面があり, 殊に顔面, 前腕, 下肢に発赤, 湿潤が著明であった。

アレルギー検査の結果, IgE 1800 U/ml, RASTにてハウスダスト, ダニ, 食物アレルギー(卵白・卵黄,

米, 大豆, 小麦, そば, ピーナッツ), 魚類に陽性であった。

治療: ①除去食療法は従来そのまま持続させ ②環境の整備, ③入浴を頻繁にする, ④石鹸, 洗剤, シャンプー類の改善, ⑤消毒療法, ⑥外用療法, ⑦インター経口, にて皮膚症状は改善してきた。

2歳11カ月頃, 風邪の時に咳発作, 喘鳴が起こるようになり, 近医にて抗アレルギー薬内服治療を開始したが, その秋(95年10～11月)には中等度の気管支喘息発作が週に1～2回起きていた。

96年9月(3歳9カ月)低アレルギー米を開始した(1日2パック, 400g)。アルブミンによる刺激指数は最高50.0→10.54と78.9%, グロブリンによる刺激指数は最高8.28→0.9と89.13%と低下した。抗IgEのCASTによる刺激指数も54.0から16.0と70.4%の低下を示した。1カ月後の皮膚症状は全体が改善し, それまで, 原因不明に膝窩, 肘部内側をかきむしること(掻破)があったがそれもなくなった。また, 全体的に粗雑な皮膚も平滑に改善してきた。更に1年前の秋季と異なり軽度の喘息発作が1回起きただけで, 以後喘息症状は起こっていない。

考 案

小児のアレルギー疾患においては, 食物アレルギーの関与する事が多い。殊に食物アレルギーは, 消化, 吸収の課程を経て消化管のみではなく全身性の症状を示す場合があることが特徴である。また, 単に即時型の反応のみでなく, 食後数時間して起きる遅発型反応, 更には液性免疫の反応のみでなく, 細胞性免疫の関与も指摘されつつあり¹⁰⁾, その診断は困難なことが多い。特に, ADと食物には, 不明な機序が多く異論が多いのが現状である⁵⁾¹¹⁾。従来食物アレルギー診断の *in vitro* 法にてはRAST法が小児にも侵襲のない方法として, 多用されており, 皮膚テストと共にアレルギーの診断法として確立されているが, 食物アレルギーに関しては時に臨床症状との解離が認められている。食物アレルギーの確定診断としてはdouble blind placebo controlled food challenge (DBPCFC) がいわゆる“gold standard”として確立されているが, 日常の診療には限界がある。更に食物アレルギーの患者は, 単一のアレルゲンに陽性を示すよりむしろ, 多種のアレルゲンに陽性を示す例が多い。今回の対象例においても

(SI) : Stimulation Index

Treatment	Before	After
a	~2	~2
b	~64	~20
c	~3	~2
d	~36	~2
e	~14	~8
f	~22	~16
g	~54	~16

Upper : There were maximum 22.4~96.7% decreases of SI by albumin.
Middle : By globulin, there were maximum 33.3~97.0% decreases of SI.
Lower : By anti-IgE, SI was decreased from mean 27.9 to 9.44 (70.3%).




Fig. 5. Comparison of hypoallergenic rice (F) and (A) with normal rice by SDS-PAGE.

There showed slight bars around 66.6 kDa and almost all salt soluble proteins were eliminated. 16 Da proteins were less than hypoallergenic rise (F).

1例を除き、6例はいわゆる三大食物アレルギーの卵・牛乳・大豆類に陽性反応を示すことにより、それらを除去し、通常の治療を行い、ある程度の症状の改善をみている。三大食品の除去は比較的容易である（例えば、卵除去食品、牛乳—豆乳、ペプチドミルク等、大豆—ノンダイズミソ、ショウユ等）。一方米は日本人の主食であり、食物全体の中で占める比率は最大であり、これを除去することは困難である。従来は低アレルギー米として、塩可溶性成分を除去したものが開発導入され、臨床的な有用性が示されており¹²⁾¹³⁾、我々の症例(a, c)の2例はその低アレルギー米を試みたが、味覚の点で問題があり、離乳の初期は別として味覚の発達した年齢になると摂取したがらず、又コストの面でも継続は不可能であった。また、米アレルギーには、雑穀が勧められることがあるが、雑穀でも米との共通抗原が多く(cross-reactivity)、真の除去になっていないことがある¹⁴⁾。Table 2にいわゆる低アレルギー米として市販されている製品を挙げる。宮川らによると、成人の難治性ADの70%に米アレルギーが認められ、低アレルギー米導入により、ADの改善をみている。今回の低アレルギー米(A)は、有機栽培米を高圧処理し、米アルブミン、グロブリンの95%を除去したものである¹⁵⁾。SDS PAGEによると、塩可溶性蛋白は

Table 2 Hypoallergenic rice

1. Protease-treated hypoallergenic rice (F)
Eliminated salt and water soluble albumin and globulin by actinase.
Effectiveness was shown in rice allergic atopic dermatitis.
2. Alkaline treated rice
Alkaline treatment was done to salt soluble particle and protein was decreased to 65%.
3. Hypoallergenic rice treated by hyperpressure (A)
By hyperpressure rice albumin and globulin were eliminated (12mg/g to 1mg/g).
Taste and flavor are close to natural.
4. Rice treated by lactose
Decreased protein by lactose. Used for renal insufficiency.

ほとんど検出せず、66.65 kDaの蛋白は多少残っているものの、16 kDaのアレルゲン蛋白は、従来の低アレルギー米よりも少なくほとんど検出されないことが示されている(Fig. 5)¹⁶⁾。その特徴は農薬の検出は認められず、栄養学的にも普通の米とほぼ同等であり、更に、調理の手間がかからず、風味が通常の米とかわらない(子供達がいやがらない)という利点がある。更に今回の如く、皮膚症状が通常の治療法にて改善はあるものの、原因不明に増悪が認められるケースにおいて、1例(症例D)を除き、それまで明らかに米が関与しているか否かの断定ができなかった症例において、RASTスコアが1又はそれ以上を示す症例に、4週間という短期の投与においても、米アレルギーCASTの低下が全例において認められ、更に臨床症状も著明に改善している事は、この低アレルギー米(A)がアレルギー疾患、殊に難病ともいえるアトピー性皮膚炎の患者に有用な食品として評価されるべきであると考えられる。

更に、これらの症例において、通常のRAST法のみでなくCAST法により米に対する陽性反応が示されており、中でも5例において刺激指数(SI)が8以上、最高50の強陽性を示しており、CAST法によるアレルギー診断法もアレルギー解析において有用な方法であると考えられる。

CAST法は1991年De Weckらにより開発されたアレルギーの診断法である。すなわち、末梢血のbuffy coatをIL-3にて刺激し、抗原を反応させることにより主として好塩基球より、アレルギー反応を惹起するsLTC₄が遊離され、一部はLTD₄、E₄に変化する。これら sulfide leukotrieneをELISA法により特異的に測

定する有意な系として、IgE 依存性のアレルギー反応のみでなく pseudo-allergy とされている非 IgE 依存性の反応をも検出する方法としてアスピリン喘息、薬物アレルギーにも応用されつつある。

細胞を用いる実験系においては、常に細胞の viability, 抗原の至適濃度、実験系の再現性が問題となるが、CAST 法においては既に De Weck らにより基礎的な検討がくり返され現在、有用な検査法として、実証されている。今回データを示していないが、我々も抗 IgE 刺激を用いた系にても、再現性が認められている。

食物アレルギーの場合の除去食の有用性、除去の期間に関しては、臨床症状が重要な客観因子であるが、今回 4 週間という短期の除去にても CAST 値の有意な低下及び症状の改善が認められたことは通常の除去期間（時に漠然と数カ月～数年という長期に行われてしまう傾向がある）に関しても、指針ともなるべき所見を提示していると考ええる。

この研究に関して、御助言くださった、奥田 稔先生、宮本昭正先生、森田 寛先生、データー整理に携わった浅田康子嬢に感謝を捧げます。

文 献

- 1) Keltelhut, B.V. and Metcalfe, D.D. : Adverse reactions to food. In "Allergy Principle and Practice" (ed by E. Middleton, C.E. Reed, E.F. Ellis, N.F. Adkinson and J.W. Yunginger), Mosby, St. Louis, pp. 1481-1502, 1988.
- 2) Metcalf, D.D. : Food hypersensitivity. *J. Allergy Clin. Immunol.* **73**, 749-762, 1984.
- 3) Michael, P. and Atherton, D.J. : Atopic eczema, In "Food Allergy and Intolerance." (ed by J. Brostoff and S.J. Challancomb), Balliere Tindall, London, pp. 583-601, 1987.
- 4) Galart S.P. : Common food allergens. In "Allergic Diseases of Infancy, Childhood, and Adolescence." (ed by C.W. Bierman, D.S. Pearlman), WB Saunders, Philadelphia, pp. 211-218, 1980.
- 5) Chandra, R.K., Gill, B. and Kumari, S. : Food Allergy and atopic disease. *Clin. Rev. All. Immunol.* **13**, 293-314, 1995.
- 6) 笹川秋彦, 伊藤満敏, 山崎 彬, 高中総一郎 : 低アレルギー無菌化包装米飯について. 新潟アレルギー研究会誌 **11**, 11-14, 1994.
- 7) 田原義和, 木村彰宏, 黒坂文武 : アトピー性皮膚炎に対する低アレルギー米 A カット米の臨床効果. アレルギー **46**, 302, 1997.
- 8) De Weck, A. L., Stadler, B.M. and Urwyler, A. : Cellular allergen stimulation test (CAST) -A new dimension in allergy diagnostics. *Allergy Clin. Immunol. News* **5**, 9-14, 1993.
- 9) Wedi, B., Elner, J., Kapp, A. : In vitro diagnosis of pseudo-allergic reactions—New aspects. *ACI International* **8/4**, 113-115, 1996.
- 10) Kondo, N., Agata, H., Fukutomi, O., Motoyoshi, F. and Orii, T. : Lymphocyte response to food antigens in patients with atopic dermatitis who are sensitive to foods. *J. Allergy Clin. Immunol.* **86**, 253-262, 1990.
- 11) 十字文子 : 食物抗原誘発テストの診断意義. アレルギーの領域 **5(7)**, 34-41, 1998.
- 12) 宮川加奈太, 平井義雄, 宮川淳子, 杉山朝美, 小松平, 他 : アトピー性皮膚炎患者における診断基準項目, 年齢分布, 重症度, IgE RAST, 血清 IgE 値の統計的解析—重症アトピー性皮膚炎患者における米アレルギーの果たす役割. アレルギー **37**, 1101-1110, 1988.
- 13) 池澤善郎, 池部敏市, 小倉英郎, 小田嶋博, 黒坂文武, 他 : アトピー性皮膚炎に対する低アレルギー米の臨床効果. アレルギー **40**, 633-642, 1991.
- 14) Broadbent, J.B. : Allergenic cross-reactivity of foods and characterization of food allergens and extracts. *Ann. All Asthma Immunol.* **75**, 295-303, 1995.
- 15) Urisu, A., Yamada, K. and Masuda, S. : 16-kilodalton rice protein is one of the major allergens in rice grain extract and responsible for cross-allergenicity between cereal grain in the Poaceae family. *Int. Arch. Allergy Appl. Immunol.* **96**, 244-252, 1991.
- 16) Matsuda, T., Nomura, R., Sugiyama, M. and Nakamura, R. : Immunochemical studies on rice allergenic proteins. *Agric. Biol. Chem.* **55(2)**, 509-513, 1991.

EFFECTIVENESS OF HYPOALLERGENIC RICE-BY CAST ANALYSIS

Fumiko Juji¹⁾, Hirotsugu Kano²⁾, Masami Narita²⁾, Noriko Shibuya²⁾
Shinichi Naritaka³⁾, Jiro Kitaura²⁾, Yoshito Sugawara⁴⁾
Akihiko Sasagawa⁵⁾ and Tsutomu Iwata⁶⁾

¹⁾Japan Clinical Allergy Institute, ²⁾Dept of Pediatrics, Faculty of Medicine, Univ. of Tokyo, ³⁾Ojima Clinic

⁴⁾Institute of Mitsubishi Chemical BCL, ⁵⁾Research Institute, Echigo Seika Co.

⁶⁾Dept of Pediatrics, Mejirodai Campus, Faculty of Medicine, Univ. of Tokyo

Rice is the main food taken every day in Japan. We introduced hypoallergenic rice (95% of albumin and globulin were taken off by hyperpressure method) for 4 weeks to 7 atopic dermatitis patients (m 3, f 4), 11 mo-4 y 8 m (mean 3 y 2 m) who showed the RAST score of rice 1 or more. Stimulation Index by CAST (cellular antigen stimulation test) were compared before and after taking the rice (50~400 g). By albumin (0.1~100 µg/ml), maximum decreases of S.I. were 22.4~96.5% (mean 70.9) and by globulin maximum decreases of S.I. were (0.1~100 µg/ml) 33.3~97.0% (mean 72.9). In all the patients the skin conditions were improved.
