



Cómo citar este artículo: Ruiz-Villaverde R, Galán-Gutiérrez M. Exacerbación de dermatitis atópica en paciente tratado con infliximab. *Actas Dermosifiliogr*. 2012; <http://dx.doi.org/10.1016/j.ad.2011.11.013>



Figura 1 Reagudización de dermatitis atópica. Estado del paciente tras la quinta infusión de infliximab.

importante reseñar que, a pesar de lo extenso de su afectación, no hubo alteraciones en las pruebas analíticas como en los casos previamente reseñados.

Con independencia de que el aumento en el conocimiento de los factores etiopatogénicos de la DA y las terapias biológicas es cada día mayor, todavía existen lagunas que nos impiden predecir el desarrollo de este tipo de efectos

secundarios, *a priori* no esperables desde el punto de vista fisiopatológico. Así, mediante la presentación de este caso queremos remarcar la importancia de la recogida minuciosa de antecedentes dermatológicos de DA en la anamnesis de pacientes subsidiarios de terapia biológica, especialmente en pacientes reumatológicos y con enfermedad inflamatoria intestinal.

Tabla 1 Características clínicas y evolutivas de pacientes con exacerbación de dermatitis atópica por infliximab

	Edad	Sexo	Patología basal	AP- atopia	Dosis	Aparición temporal de la reagudización de la DA	Evolución y actitud respecto a IFX
1 (Wright RC ⁴)	83	Varón	Psoriasis	+	5 mg/kg/día	1. ^a infusión	Continúa control con terapia tópica
2 (Wright RC ⁴)	68	Mujer	Artritis reumatoide	+/-	5 mg/kg/día	No especificado	Continúa control con terapia tópica
3 (Vestergaard C et al. ⁵)	46	Varón	Psoriasis suberitrodermica + artropatía psoriásica	+	5 mg/kg/día	7. ^a infusión	Suspendido control con ciclosporina
4 (Vestergaard C et al. ⁵)	68	Varón	Psoriasis pustulosa	+	5 mg/kg/día	8. ^a infusión	Suspendido control con ciclosporina
5 (Chan JL et al. ⁶)	45	Varón	Psoriasis	+	3 mg/kg/día	2. ^a infusión	Continúa control con terapia tópica
6 (Chan JL et al. ⁶)	62	Mujer	Artritis reumatoide	+	5 mg/kg/día	7. ^a infusión	Continúa control con terapia tópica
7 (Chan JL et al. ⁶)	15	Varón	Enfermedad de Crohn	+	5 mg/kg/día	3. ^a infusión	Suspendido control con terapia tópica
8 (Ruiz-Villaverde et al.)	30	Varón	Colitis ulcerosa	+	5 mg/kg/día	5. ^a infusión	Suspendido control con CTC v.o. + tópicos

AP: antecedentes personales; CTC v.o.: corticoterapia vía oral; DA: dermatitis atópica; IFX: infliximab.

Cómo citar este artículo: Ruiz-Villaverde R, Galán-Gutierrez M. Exacerbación de dermatitis atópica en paciente tratado con infliximab. *Actas Dermosifiliogr.* 2012. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ad.2011.11.013>



Figura 2 Mejoría clínica de nuestro paciente a las 3 semanas de tratamiento con corticoterapia oral.

Responsabilidades éticas

Protección de personas y animales. Los autores declaran que los procedimientos seguidos se conformaron a las normas éticas del comité de experimentación humana responsable y de acuerdo con la Asociación Médica Mundial y la Declaración de Helsinki. Confidencialidad de los datos. Los autores declaran que han seguido los protocolos de su centro de trabajo sobre la publicación de datos de pacientes y que todos los pacientes incluidos en el estudio han recibido información suficiente y han dado su consentimiento informado por escrito para participar en dicho estudio. Derecho a la privacidad y consentimiento informado. Los autores han obtenido el consentimiento informado de los pacientes y/o sujetos referidos en el artículo. Este documento obra en poder del autor de correspondencia.

Bibliografía

1. Thielen AM, Kuenzli S, Saurat JH. Cutaneous adverse events of biological therapy for psoriasis: review of the literature. *Dermatology*. 2005;211:209–17.
2. Jacobi A, Antoni C, Manger B, Schuler G, Hertl M. Infliximab in the treatment of moderate to severe atopic dermatitis. *J Am Acad Dermatol*. 2005;52:522–6.
3. Díaz-Ley B, Guhl G, Fernández-Herrera J. Uso de fármacos biológicos en dermatosis fuera de la indicación aprobada.

Primera parte: infliximab y adalimumab. *Actas Dermosifiliogr*. 2007;98:657–78.

4. Wright RC. Atopic dermatitis-like eruption precipitated by infliximab. *J Am Acad Dermatol*. 2003;49:160–1.
5. Vestergaard C, Deleuran M, Kragballe K. Two cases of atopic dermatitis-like conditions induced in psoriasis patients treated with infliximab. *J Eur Acad Dermatol Venereol*. 2007;21:1272–4.
6. Chan JL, Davis-Reed L, Kimball AB. Counter-regulatory balance: atopic dermatitis in patients undergoing infliximab infusion therapy. *J Drugs Dermatol*. 2004;3:315–8.
7. Mangge H, Gindl S, Kenzian H, Schauenstein K. Atopic dermatitis as a side effect of anti-tumor necrosis factor-alpha therapy. *J Rheumatol*. 2003;30:2506–7.
8. Esmailzadeh A, Yousefi P, Farhi D, Bachmeyer C, Cosnes J, Berenbaum F, et al. Predictive factors of eczema-like eruptions among patients without cutaneous psoriasis receiving infliximab: a cohort study of 92 patients. *Dermatology*. 2009;219:263–7.
9. Heymann WR. Antipsoriatic biologic agents for the treatment of atopic dermatitis. *J Am Acad Dermatol*. 2007;56:854–5.

R. Ruiz-Villaverde* y M. Galán-Gutierrez

Unidad de Dermatología, Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén, España

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: ismenios@hotmail.com
(R. Ruiz-Villaverde).